

痉湿喝病脉证治第二

一、单项选择题

1. 痉病的主脉是（ ）
A. 浮紧 B. 紧而弦 C. 沉迟 D. 沉而细 E. 浮数
2. 柔痉的治疗选方为（ ）
A. 调胃承气汤 B. 葛根汤 C. 防己黄芪汤 D. 止痉散 E. 栝蒌桂枝汤
3. 太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细者，此名（ ）
A. 血痹 B. 历节 C. 痛痹 D. 湿痹 E. 风痹
4. 麻杏苡甘汤证属（ ）
A. 风湿表虚 B. 风湿阳虚 C. 寒湿表虚 D. 风湿阳郁化热 E. 风湿在表化热
5. 风湿，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩，方用（ ）
A. 桂枝加附子汤 B. 桂枝附子汤 C. 桂枝去芍药汤
D. 防己黄芪汤 E. 甘草附子汤
6. 麻黄加术汤证的病机是（ ）
A. 风湿在表 B. 风湿兼气虚 C. 风湿兼阳虚 D. 风湿表里阳虚
E. 寒湿郁表

二、多项选择题

1. 痉病的治法可用（ ）
A. 汗法 B. 下法 C. 吐法 D. 补法 E. 温法
2. 甘草附子汤证的临床表现有（ ）
A. 午后潮热 B. 汗出短气 C. 不呕不渴 D. 恶风不欲去衣 E. 小便不利
3. 桂枝附子汤的药物组成为（ ）
A. 桂枝 白芍 炮附子 B. 桂枝 炮附子 C. 炙甘草 生姜 大枣
D. 甘草 大枣 E. 生姜 大枣

三、名词解释

1. 刚痉
2. 柔痉
3. 中喝
4. 湿痹

四、填空

1. 伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，_____，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之，若大便坚，小便自利者，_____。
2. 湿家身烦疼，可与麻黄加术汤发其汗为宜，_____。
3. 湿病的发汗法当为_____。

五、简答题

1. 如何理解“湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便”？
2. 简述防己黄芪汤的药物组成及证治？
3. 试比较麻黄加术汤证与麻杏苡甘汤证有何异同？
4. 如何鉴别刚痉与柔痉？

六、论述题

1. 试述湿病的治疗原则是什么？说明其机理。
2. 试述《金匱》对痉病的辨证施治。
3. 试比较桂枝附子汤、白术附子汤、甘草附子汤的证治异同。

§参考答案

一、单项选择题

1. B 2. E 3. D 4. E 5. B 6. E

二、多项选择题

1. AB 2. BDE 3. BC

三、名词解释

1. 刚痉：是外感痉病的一种以头项强急，口噤，甚则角弓反张，发热恶寒，无汗为主症的疾病。
2. 柔痉：是外感痉病的一种以头项强急，口噤，甚则角弓反张，发热汗出而不恶寒为主症的疾病。
3. 中暍：即夏季之伤暑，外感暑热之邪，多有挟湿。
4. 湿痹：痹，闭也。指湿邪留注关节，闭阻筋脉气血，出现关节疼痛的病证。

四、填空

1. 不呕不渴 白术附子汤主之 2. 慎不可以火攻之 3. 微汗

五、简答题

1. 如何理解“湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便”？

本篇提出的湿痹之候，是以“小便不利，大便反快”为特征的湿病，这种特征不同于一般的湿邪在表之候，而是内湿与外湿相合的指征性表现，说明外湿内趋，病程已迁延一定时日，正气无力抗邪。既有外湿流注关节，筋脉造成的关节烦疼之症，又有内湿为重引起的“小便不利，大便反快”之症，是湿邪内阻影响膀胱气化而小便不利；湿趋大肠则大便反快。故宜取利小便法。小便得利则内湿去，阳气通，外湿亦可随之祛除。此即“利小便，所以实大便”，“治病求本”之谓。

2. 简述防己黄芪汤的药物组成及证治？

防己黄芪汤的药物组成为：黄芪、防己、白术、甘草、生姜、大枣。本方可治风湿表虚证，临床表现为一身关节疼重、恶风、自汗、脉浮，系由表气不足，又受湿邪或风湿犯表，卫气被伤，失于固护所致，虽为风湿邪在表，但表气已虚，故不应更发汗伤正，而应当用益气固表，祛风除湿法治之。

3. 试比较麻黄加术汤证与麻杏苡甘汤证有何异同？

相同点：均为湿邪在表之表实证，以一身关节疼烦为主症，以微汗法治疗，二方用药均有麻黄、杏仁、炙甘草，是由麻黄汤变化而来。不同点：麻黄加术汤

证为寒湿在表，除主症外，尚有发热、恶寒、无汗、脉浮紧等表现，治法为微发汗、除寒湿，宜用麻黄汤加白术。麻杏苡甘汤证为风湿在表，有化热、化燥倾向，除主症外，以发热午后为重、无汗、恶风为特征，故治以发汗除湿、轻清宣化，方用麻黄汤减桂枝加薏苡仁，且小其制。

4. 如何鉴别刚痉与柔痉？

“金匱”将痉病分为刚痉与柔痉。二者除发热、颈项强急、口噤、甚则角弓反张等痉病的共同主症外，刚痉以恶寒、无汗为特征；柔痉以汗出而不恶寒为特征。

六、论述题

1. 试述湿病的治疗原则是什么？说明其机理。

湿病有外湿和内湿之分，外湿常兼风邪，而成风湿之邪，宜用微汗法；内湿宜用利小便法，此为《金匱》对湿病提出的治疗原则。治外湿之发汗法，必须遵循微汗法的原则。因为风为阳邪，其性轻扬，易于表散；湿为阴邪，其性濡滞，难以速去。如果发大汗，则风气虽去，而湿邪仍在，不仅病未愈，还易伤卫阳及阴津。故取微汗，使阳气内蒸而不骤泄，在肌肉、关节之间充满流行，营卫通畅，可使风湿之邪一并宣泄而俱去。

内湿宜利小便法。因病人素有内湿，又招致外湿，形成内外合邪，且内湿重于外湿，表现为“小便不利，大便反快”。必须治以利小便法，小便得利，则里湿去，阳气通，湿痹自除。可见，湿病治法虽有发汗和利小便之不同，但除湿必须通阳，阳气宣畅，湿邪方可尽除。禁忌大汗、火攻和下法。

2. 试述《金匱》对痉病的辨证施治。

本篇论述痉病的证治主要有三种情况：柔痉、欲作刚痉、阳明里热成痉。三者存在共同的病机，即邪伤筋脉，津液不足，筋脉失养而拘急不舒。其治法虽有微汗和泻下之不同，但其目的均以祛除病邪，固护津液为主。柔痉的病机为外感风邪，津液不足，邪伤筋脉，又营卫不和所致。症见发热汗出、身体强几几、脉反沉迟；治以调和营卫、清热生津疏筋；方用栝蒌桂枝汤，即桂枝汤加栝蒌根。欲作刚痉的证治，指痉病发作初起或将要发作，病机为风寒表实，邪伤筋脉，津液不足或输布不利所致。症见发热、恶寒、无汗、小便不利，气上冲胸，口噤不得语。治以发汗解肌、生津疏筋；方用葛根汤，即桂枝汤加麻黄、葛根而成。里热成痉多为外感邪气不解而入里化热，伤津动风所致，症见壮热息高、胸满口噤、卧不着席、脚挛急，必齿介齿。治当攻下实热，急下存阴，方用大承气汤，当得下止服。

3. 试比较桂枝附子汤、白术附子汤、甘草附子汤的证治异同。

相同点：桂枝附子汤、白术附子汤、甘草附子汤三方证均为风湿兼阳虚证，其治法均为温经通阳、祛风化湿法，方中均用炮附子，但各有特点：桂枝附子汤证属于风湿在表，风重于湿的表阳虚证，症见“身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩”，是邪未入里，表阳已虚，故以桂枝配炮附子温经助阳、祛风化湿。白术附子汤证系服桂枝附子汤后，风邪得除而外湿仍在，因湿邪为重，表阳不足。除上症外，又见大便坚而小便利，故仍遵原法。因桂枝有助热伤津之弊，故当减去，再加白术。此处白术当为生白术，配炮附子，不但能通阳除湿，更能扶脾生

津以通便，此为证情而设，亦为治未病而设。甘草附子汤证为风湿两盛，表里阳气俱虚，此时邪伤已久，正不胜邪，亦不任攻伐，其表现为“骨节疼烦掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣、或身微肿”，故将炮附子、白术、桂枝并用，但小其制，且以（炙）甘草名方，意在缓图，温复表里之阳气、祛风除湿。