

1990年7月12日 科别：中医内科

姓名：马XX 性别：男 年龄：61岁 职业：退休工人

主诉：头晕头痛反复发作18年，加剧2天

病史：患者1972年起经常头晕头痛，曾在该厂医务室及我院门诊测量血压，一直在180/105mm/Hg左右，服用“复方罗布麻”、“尼群地平”等，疗效欠佳。近两日来，自觉头晕头痛加剧，伴头目发胀，口苦咽干，烦躁失眠，腰膝酸软无力，夜尿多。食纳尚可。

体查：T37.6C，P81次/分，R19次/分，BP195/120mmHg

面色稍红，唇赤。双肺正常。心尖搏动向左下移位，心浊音界稍向左扩大。心率每分钟81次，率齐，无杂音。舌质红，舌苔薄黄，脉弦。

实验室检查：心电图：左心室增大。

此乃肝肾阴虚，肝阳上亢，肝火上炎所致。

诊断：中医诊断：晕眩病（阴虚阳亢证）

西医诊断：高血压病（II期）

处理：平肝泻火，滋养肝肾。天麻钩藤饮加减。

天麻10克 钩藤10克 黄芪10克 山栀子10克

牛膝15克 杜仲15克 茯神10克 桑寄生15克

石决明15克 茺蔚子15克 甘草3克

水煎服，每日一剂，共5剂。

医嘱：全休七天；戒烟戒酒；低盐低脂饮食



复方罗布麻片 I 使用说明书

药品名称

通用名：复方罗布麻片 I

英文名：Compound Kendir Lenses Tablets I

汉语拼音：Fufang Luobuma Pian I

本品为复方制剂，其组分为每1000片含：罗布麻叶218.5g、野菊花171.0g、防己184.4g、三硅酸镁15.0g、硫酸双胍屈嗪1.6g、氢氯噻嗪1.6g、盐酸异丙嗪1.05g、维生素B10.5、维生素B60.5g、泛酸钙0.25g。

适应症：用于高血压病

用法用量：口服，一次2片，一日3次。维持量：一日2片。

不良反应：尚未发现有关不良反应报道。

禁忌：对本品过敏者禁用。



批准文号：国药准字 H32022692

适应症：抗高血压，钙离子拮抗剂。

用法用量：口服，成人常用量：开始一次口服10mg（1片），一日1次，以后可根据情况调整为每次20mg，一日2次。

注意：个别病例因血管扩张，偶尔出现轻度头痛，颜面潮红，

口干，不需停药，可自行消失。

July 12th 1990, Chinese internal medicine

Name: Ma Sex: male Age: 61 Job: retired worker

Main Description: always been faint and headache in last 18 years and more serious than before these two days.

Medical History: The patient's blood pressure always kept between 180 and 105mm/Hg. The patient had taken Compound Kendir Lenves Tablets I and Nitrendipine Tablets, but the curative effect was not distinct. Last two days, the patient felt dizziness and headache more seriously, with the tumid feeling in head and eyes, bitter taste and dry throat, sleeplessness, weakness of loins and knees, high frequent nocturia and normal appetite.

Body Examination: T36.6℃, 195/120mm/Hg

Cause: Kidney and liver Yin deficiency, liver fire and Yang hyperactivity

Diagnose of TCM: Syndrome of Yin deficiency and Yang hyperactivity .

Diagnose of Western Medicine: Hypertension(II)

Therapy of TCM: To nourish the liver and kidney and reduce the liver fire.

Prescription: 天麻钩藤饮加减。

天麻 10 克 钩藤 10 克 黄芪 10 克 山栀子 10 克

牛膝 15 克 杜仲 15 克 茯神 10 克 桑寄生 15 克

石决明 15 克 茺蔚子 15 克 甘草 3 克

水煎服，每日一剂，共 5 剂。

Doctor's Suggestion: Rest for a week, low fat low salt food.