

急性坏死性筋膜炎

孙某，男性，76岁。

于2004年2月10日因“肛周阴囊会阴部肿痛伴发热1周”拟“急性坏死性筋膜炎”收治。入院时体温38℃，神志清醒，精神痿软。查体见肛周红肿，境界清楚，局部呈紫褐色，阴囊肿大，局部呈褐色，有大小不等水疱，疱下呈现不规则的出血性坏死并有淡黄色渗出液，味臭秽明显，舌质红，苔薄黄，脉弦数。入院查血常规：白细胞 $13.6 \times 10^9/L$ ，中性87.6%，红细胞 $4.6 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白120g/L，尿粪常规无异常。血清丙氨酸氨基转移酶39U/L，尿素氮7.1mmol/L，肌酐171 $\mu\text{mol}/L$ 。血糖15.6mmol/L。胸片及心电图无异常。腹部平片有不完全性肠梗阻，考虑麻痹性肠梗阻可能。肛周CT平扫示阴囊、会阴及两前侧腹壁皮下大量气体，阴囊内积液，符合坏死性筋膜炎表现。

入院当日在连续硬膜外麻醉下行多切口扩创引流。

术后用3%双氧水、0.5%甲硝唑、0.9%生理盐水依次冲洗后，以丹药脱腐。根据药敏试验结果应用甲硝唑、罗氏芬静脉滴注。并入大型多人高压氧舱，2h/d。

治疗两月余，痊愈出院。



术前



术中



术后



愈合